

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

骨髄の発育不良に

ステイタスD₃

ビタミンD主薬製剤

ステイタスD₃は、

- 腸からのカルシウムの吸収を高め、骨や歯の発育を促進するビタミンD製剤です。
- カルシウムが特に必要とされる発育期、妊娠・授乳期、老年期の方にも適しています。
- 服用しやすい、小粒のソフトカプセル剤です。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

【効能・効果】

- 骨髄の発育不良。
- くる病の予防。
- 次の場合のビタミンDの補給：
発育期、妊娠・授乳期、老年期。

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	2カプセル	1 回
7才以上 15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】 (2カプセル中)

コレカルシフェロール・・・・・・・・・・・・・・0.01 mg
(ビタミンDとして400 IU)

添加物としてゼラチン、D-ソルビトール、黄色5号、ゴマ油、酸化チタンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、カプセルをとりだすときはキャップにとり、手にふれたカプセルはピンに戻さないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) お客様相談室
住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-22-14
電話：03 (3986) 0613
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝祭日を除く)



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14
営業所 東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>