

リコリス^{ゼンヤク}
小児用

お子さま用


使用期限 製造番号



リコリス^{ゼンヤク}
小児用

カゼなどで熱がある時・発育期の
栄養補給、虚弱体質に。

発熱性消耗性疾患・胃腸障害などの
栄養補給、滋養強壮に。



医薬品 20ml×3本

20ml×3本

リコリス^{ゼンヤク}
小児用

バーコード



20ml×3本

押してあける

リコリス「ゼンヤク」小児用は、甘い生薬・カンゾウ（甘草）エキスを配合した、のみやすい味のお子さま用内服液剤です。かぜなどの発熱性消耗性疾患や胃腸障害・病中病後などの栄養補給に適しています。

【使用上の注意】

※本剤は小児用ですが、滋養強壮保健薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。
してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）
長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。
 - (3) 次の症状のある人。むくみ
 - (4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

幼小児の発育期・偏食児・発熱性消耗性疾患・病中病後・胃腸障害・栄養障害などの栄養補給、虚弱体質、滋養強壮。

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
3才以上 15才未満	1びん (20ml)	3回
3才未満	服用しないこと	

※小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分】(1びん20ml中)

カンゾウ（甘草）エキス……………100mg
（原生薬換算量 500mg）

グルコン酸カルシウム……………100mg

リボフラビン（ビタミンB₂）……………0.67mg

オロチン酸コリン……………25mg

アミノエチルスルホン酸……………100mg

バンテノール……………3.33mg

添加物としてアルコール、安息香酸、パラベン、カラメル、チンピチンキ、白糖、水アメ、dl-リンゴ酸等を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビン（ビタミンB₂）によるものですので、心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとこない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



製造販売元 全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14
営業所 東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>
お客様相談室 TEL03(3986)0613

