

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# カタセ錠A<sup>®</sup>

— カルシウム剤 — (フィルムコーティング錠)

## 第3類医薬品

カタセ錠Aは、身体にとって大切な栄養成分でありながら、毎日の食事では不足しがちなカルシウムを効率よく補給するためにつくられた医薬品のカルシウム剤です。

1. 骨がもろくなるのを防ぎ、骨や歯の発育を促します。
2. 吸収のよい2種類のカルシウム成分を配合し、不足しがちなカルシウムを効率よく補給します。
3. カルシウムの吸収を助けるアミノ酸（L-リジン塩酸塩、タウリン）と胆汁酸成分ウルソデオキシコール酸を配合しています。

### 【使用上の注意】



#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。  
医師の治療を受けている人。
2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。  
便秘
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

### 【効能・効果】

- 次の場合の骨歯の発育促進：  
虚弱体質、腺病質<sup>\*</sup>。
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱<sup>せいじやく</sup>防止。

〔※腺病質<sup>しんしやくせい</sup>：滲出性あるいはリンパ体質（アレルギー、湿疹などになりやすい体質）の小児や無力体質（体力のない体質）、神経質のことをいいます。〕

### 【成分】 (15錠中)

沈降炭酸カルシウム…………… 1,225mg  
グルコン酸カルシウム水和物…………… 1,250mg  
(カルシウムとして計602mg)  
ウルソデオキシコール酸…………… 10mg  
L-リジン塩酸塩…………… 100mg  
タウリン…………… 167mg  
添加物としてD-マンニトール、カルメロース、硬化油、酸化チタン、ステアリン酸M<sub>8</sub>、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴールを含有します。

## 【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

| 年 齢         | 1 回 量   | 1日服用回数 |
|-------------|---------|--------|
| 15才以上       | 5錠      | 3回     |
| 11才以上 15才未満 | 3錠      |        |
| 7才以上 11才未満  | 2錠      |        |
| 5才以上 7才未満   | 1錠      |        |
| 5才未満        | 服用しないこと |        |

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

## 問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電話：03（3946）3610  
受付時間：9:00～17:00  
(土、日、祝祭日を除く)



製造販売元

**全薬工業株式会社**

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>