

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

消炎剤・殺菌剤配合

ピロット[®]D

外用湿疹・皮ふ炎用薬 (ローション剤)

ピロットDは、広い患部や毛髪部位の湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれなどの皮ふ病の治療に適した、のびがよく、べつつかないローション剤です。

湿疹、皮ふ炎などの炎症やかゆみを抑える消炎剤・酢酸デキサメタゾンと、細菌の感染を防ぐ殺菌剤・塩化ベンザルコニウムを配合しています。

【使用上の注意】

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。

水痘(水ぼうそう) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ (患部)	みずむし・たむし等の白せん症、 にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、じんましん、あせも、かぶれ、しもやけ、かゆみ、虫さされ。

【用法・用量】

1日数回、患部に塗布又は塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

【成分】（18中）

酢酸デキサメタゾン・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.25 mg

塩化ベンザルコニウム液（10%）・・・・・・・・ 0.005 ml

添加物としてジブチルヒドロキシルエン、ステアリン酸ソルビタン、トリエタノールアミン、パラベン、ポリソルベート60、オクチルドデカノール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na、ラウロマクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

1) 購入した薬局・薬店

2) お客様相談室

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-22-14

電話：03（3986）0613

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>