

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ジキニン[®] 鼻炎AG 顆粒

鼻炎用内服薬

第2類医薬品

ジキニン鼻炎AG顆粒は、生薬ベラドンナの抽出成分ベラドリリン20などの働きにより、花粉、ハウスダスト、ダニなどが原因で起こるアレルギー性鼻炎や、急性鼻炎による、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりにすぐれた効き目を発揮します。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難
- (3)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)

4. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。高熱、排尿困難、むくみ
- (7)次の診断を受けた人。緑内障、腎臓病
- (8)モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。
- (9)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
* 精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

〔表面からのつづき〕

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い。

【用法・用量】

次の量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15才以上	1 包	3 回
11才以上 15才未満	2/3包	
7才以上 11才未満	1/2包	
3才以上 7才未満	1/3包	
3才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】

成 分 名	分 量 (1包1g中)	はたらき
ベラドリン20	0.67 mg (ベラドンナ総アルカロイドとして0.13mg)	自律神経に働いて、鼻みずの分泌を抑えます。
グリチルリチン酸	46.7 mg	鼻粘膜の炎症を抑えます。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	2 mg	鼻みず、くしゃみなどのアレルギー症状を抑えます。
塩酸プソイドエフェドリン	60 mg	血管収縮作用により鼻粘膜の充血を抑えて、鼻みず、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	50 mg	頭重感をやわらげます。

添加物としてクエン酸、トウモロコシデンプン、乳糖、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、酒石酸、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>