



アルクラック®内服液

第2類医薬品



筋肉がつる・痛い

効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の激なれいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：筋肉のけいれん、こむらがえり、腹痛、腰痛。

成分(1日量3びん90mL中)

芍薬甘草湯エキス・2,400mg
〔シャクヤク···6.0g
カンゾウ(甘草)···6.0g
より抽出〕

添加物としてアルコール、安息香酸Na、エチルベンゼン、D-ソルビトール、バニリン、バラベン、プロピレングリコール、I-メントール、香料、スクラロース、ハチミツを含有します。

このような筋肉がつる痛みに

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931アルクラック®
内服液つる
筋肉が
・痛い

30mL×3本入

製造販売元
全薬工業株式会社

第2類医薬品



4 987305 510914

使用期限
(年/月)

1-1



用法・用量

次の量を食前又は食間※によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日
大人 (15才以上)	1びん (30mL)	3回
15才未満	服用しないこと	

〔※食間：「食事と食事の間」という意味で、食後2~3時間を持します。〕

●生葉エキスを使用していますので、沈殿が生じますが、薬効には変わりありません。
よく振ってから服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都文京区大塚5-6-15

http://www.zenyaku.co.jp

全薬工業お客様相談室TEL:03(3946)3610

<月~金曜日9:00~17:00(祝祭日を除く)>

開封口

アルクラック内服液は

- 足やわき腹などがつるといった『筋肉の激なれいれんに伴う痛み』を鎮めます。
- 1回1本飲みきりタイプの液剤です。

使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないでください。

次の診断を受けた人。心臓病

2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


- 医師の治療を受けている人。
- 妊娠又は妊娠していると思われる人。
- 高齢者。
- 次の症状のある人。むくみ
- 次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



紙箱