

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には
よくお読みください。

KAIGEN

総合かぜ薬

カイゲン感冒カプセル

第②類医薬品

カイゲン感冒カプセルは、アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩などのかぜの諸症状を緩和する成分に加えて、3種類の和漢生薬を配合したトータルケアのかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

- (3) 授乳中の人。

- (4) 高齢者。

- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- (6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

- (7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、
緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

(裏面もお読みください。)

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（発熱、のどの痛み、せき、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、たん、頭痛、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の1回量を、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
15才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思ひぬ事故につながります。)



成分・分量 6カプセル(成人1日量)中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	770mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状をやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき中枢にはたらいて、せきをしのぎます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしのぎます。
無水カフェイン	75mg	熱や痛みをとる成分のはたらきを補助します。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg	発熱時に不足しがちなビタミンB ₂ を補給します。
キキョウ乾燥エキス (キキョウとして540mg)	120mg	たんを出しやすくします。
ケイヒ末	120mg	熱を下げ、関節の痛みをやわらげます。
地竜乾燥エキス (ジリュウとして420mg)	54.5mg	緩和な解熱効果と、せき止めの作用があります。

添加物として乳糖、セルロース、タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)外箱に表示の使用期限が過ぎた製品は服用しないでください。



お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話06-6202-8911

受付時間：9:00~17:00 (土曜、日曜、祝日を除く)

発売元 **カイゲンファーマ株式会社**
大阪市中央区道修町二丁目5番14号

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15番1