


こりと痛みに ゴールドパスE



肩のこり・筋肉痛

ゴールドパスE

医薬品

気孔付



キョクトウ 株式会社

こりと痛みに ゴールドパスE
製造番号
使用期限

05.11

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨折痛

成分及び分量

1.0m²中 サリチル酸メチル…9.00 g ノニル酸ワニリルアミド…0.01g
dl-カンフル…1.80 g ハッカ油…1.20 g l-メントール…4.50 g 酢酸トコフェロール
(ビタミンE)…0.50 g 添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステル
ガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸
-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴム
ラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

鎮痛消炎薬

ゴールドパスE



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部にはる。

(用法及び用量に関連する注意)

(1)用法及び用量を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

(4)皮ふのとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。

(5)皮ふの弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

[保管及び取り扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)

(4)開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口

TEL 076(479)1313 (土、日、祝日を除く)

受付時間 9:00～17:00

74mm×52mm 大判20枚入 ￥400+税



紙

：箱



フィルム

：外装

品目番号 追13-74-565

肩のこり・筋肉痛

ゴールドパスE

発売元 キョクトウ株式会社

富山市牛島新町8番10号

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173