

第3類医薬品

ゴールドパスE

こりと痛みに



肩のこり・筋肉痛

ゴールドパスE

第3類医薬品

気孔付



キョクトウ 株式会社

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨折痛

成分及び分量 1.0m²中 サリチル酸メチル…9.00 g ノニル酸ワニリルアミド…0.01 g
dl-カンフル…1.80 g ハッカ油…1.20 g l-メントール…4.50 g トコフェロール酢酸
エステル(ビタミンE)…0.50 g 添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、
エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アク
リル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、
天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

こりと痛みに 鎮痛消炎プラスター

品目番号 74-565

使用期限

製造番号

08.09

2015.12 1E060

鎮痛消炎薬 ゴールドパスE

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合



：箱



：外装フィルム

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部にはる。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4)皮ふのとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5)皮ふの弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判20枚入 ￥400+税



4 951079 882010

キョウトウ 株式会社

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋町等173

お客様相談窓口

電話：076-479-1313 (土、日、祝日を除く)

受付時間 9:00～17:00

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)