

matsu
kiyo

140枚

1日1~2回

ゴールドパスE

鎮痛消炎プラスター

痛みのもとに密着浸透

肩こり
筋肉痛・腰痛に

1枚サイズ(6.2cm×4.2cm)

保存袋付

薬のはたらき

肩こり

筋肉痛

腰痛

サリチル酸メチル:9.00g

・痛みを鎮めます

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE):0.50g

・血行を促進します

ノニル酸ワニリルアミド:0.01g

dl-カンフル:1.80g

・炎症を抑えます

ハッカ油:1.20g

l-メントール:4.50g

・清涼感を与えます

第3類医薬品

1.0㎡

販売名:ゴールドパスE

鎮痛消炎薬

第3類医薬品

こんな方におすすめ 肩こり・筋肉痛・腰痛でお困りの方

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないこと (1)目の周囲、粘膜等、(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋力疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚サイズ(6.2cm×4.2cm)

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山県富山市水橋島等173

お客様相談窓口 ☎076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土、祝日を除く)

【成分及び分量】1.0㎡中

dl-カンフル	1.80g
サリチル酸メチル	9.00g
ハッカ油	1.20g
l-メントール	4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01g
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。	

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

※この商品には(株)マツキョーホールディングスのオリジナル商品です。