

シートハップ.P

第3類医薬品

うちみ・ねんざ・筋肉痛・肩こり・腰痛

スポーツのあとに



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



配置期限

ロット番号

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても、症状がよくなる場合

成分及び分量 膏体 100 g 中

サリチル酸グリコール 1.000 g
dl-カンフル 0.200 g
l-メントール 0.300 g
トコフェロール酢酸エステル 0.300 g
添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノセテート、モノオレイン酸ソルビタン、香料を含有する。

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部にはる。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性がありますので、使用をお控えください。
(4) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管すること。
(5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話 076-479-1313

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

6枚入 (11.8cm×7.5cm)

¥900+税 PP

T01



↓ 切り取り線