

**使用上の注意****❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚(6.2cm×4.2cm)

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話 076-479-1313

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

成分及び分量 1.0㎡中

dl-カンフル	1.80g
サリチル酸メチル	9.00g
ハッカ油	1.20g
l-メントール	4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01g
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含みます。	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発 売 元 **ゲンキー株式会社**

福井県坂井市丸岡町下久米田 38-33

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**

富 山 市 水 橋 畠 等 173