

成分及び分量 1.0m²中 サリチル酸メチル…9.00g ノニル酸ワニリルアミド…0.01g
dl-カンフル…1.80g ハッカ油…1.20g l-メントール…4.50g 酢酸トコフェロール
(ビタミンE)…0.50g 添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステ
ルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリ
ル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、
天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

効果又は効果
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨折痛



こりと痛みに
はりぐすり
気孔付



こりと痛みに

医薬品

大判

気孔付 ビタミンE配合
ワイドパスE



大協薬品工業株式会社



気孔付 はりぐすり

配置期限

ロット番号

こりと痛みに ワイパースE

製造販売元
お客様相談窓口



大協薬品工業株式会社

富山市水橋 電話 173
TEL 076-479-1313 (土、日、祝日を除く)
受付時間 9:00~17:00

鎮痛消炎薬 ワイパースE

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

用法及び用量

- 1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼る。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4)皮ふのとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5)皮ふの弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判20枚入 ￥400+税

:箱

:外装フィルム