


Hot Sheet Hap

温感シートハップ。



腰痛

関節痛に

医薬品

パップ剤と
粘着シートが

1体型

6枚入

温感シートハップ。

(鎮痛消炎薬)



● はがしぐちテープ
を取り除いて貼
てください。



お問い合わせ先
大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口
TEL 076-479-1313(土、日、祝日を除く)
受付時間 9:00~17:00

製造販売元  大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173

配置期限 ロット番号

① 使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
2. 本剤使用による強い刺激を避けるための事項。
本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には貼らないでください。

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1~2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼る。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性がありますので、使用をお控えください。
- (4) 皮ふのとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5) 皮ふの弱い人は、使用前に皮ふの弱い個所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

- (6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (7) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (8) 打撲、捻挫には、はれがひいてから使用してください。
- (9) 粘着シート等でかぶれやすい人は、使用しないでください。

成分及び分量 膏体100g中

オウバク軟エキス	0.33g
(原生薬換算量)	1.089g
トウガラシエキス	0.06g
(原生薬換算量)	3.00g
dl-カンフル	0.20g
l-メントール	0.30g
酢酸トコフェロール	0.20g
塩酸ジフェンヒドラミン	0.18g
添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、亜硫酸水素ナトリウム、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタンを含有する。	

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

6枚入(11.8cm×7.5cm)

品目番号 追7-74-523

¥850+税

PP



↓「切り取り線」残りの薬が乾燥しないように、折りまげて保管してください。