

外用鎮痛消炎薬 販売名: 温丸膏 第3類医薬品

こりや痛みの部分にピンポイントで貼れる温感プラスターです。
ニール酸ワニリアミドによる温感刺激とビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)のダブル効果で患部の血行を促進します。
サリチル酸グリコールとL-メントールの消炎効果で患部の痛みを取り除きます。
シートにスリットが入っておりますので伸縮部分にもピッタリフィットします。
また、汗も逃がし易くっております。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

腰痛,打撲,捻挫,肩こり,関節痛,筋肉痛,筋肉疲労,しもやけ

〔用法及び用量〕

1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

この外箱は製品とともに保管し、使用の際には必ずお読みください。

- (4) 汗をかいたり、患部がめれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

〔成分及び分量〕 1.0m²中

L-メントール4.5g サリチル酸グリコール8.0g
 トコフェロール酢酸エステル...0.5g ノニル酸ワニリルアミド0.04g
 添加物：ポリブテン、生ゴム、ポリシブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸
 Ca、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、
 リオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ゴムラテックス、赤色405号

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります.)。
- (4) 開封後は未使用分をアルミ袋に入れチャップを閉め外箱に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

お問い合わせ先
大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口 電話 076-479-1313
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**
富山市水橋町等173



紙

T22

使用期限

听 番 短 鼓

肩こり、腰痛に

肩こり、腰痛に
ピンポイントで貼れる
温感タイフの鎮痛消炎貼り薬

肩こり、腰痛に

温感刺激×ビタミンE

¥180

税 控除 対象

スリット入りで
△に△に
原寸大

ピンポイントで貼れる
温感タイプの
鎮痛消炎貼り薬

晉

第3類医薬品
外用鎮痛消炎薬
あたたまろう
温丸膏

ピンポイントで貼れる
温感タイプの鎮痛消炎貼り薬

肩こり、腰痛に
ピンポイントで貼れる
温感タイプの鎮痛消炎貼り薬

開封年月日
年 月 日