

こりと  
痛みに

第3類医薬品

ファイナルバンA

ファイナルバンA


22枚入

ビタミンE 配合

こりと  
痛みに

第3類医薬品

肩こり  
関節痛  
腰痛  
捻挫



こりと  
痛みに

鎮痛消炎プラスター

ロット番号

配置期限



外装フィルム



箱

## 鎮痛消炎薬

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の人は使用しないこと  
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の部位には使用しないこと  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

## 🗨 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

## 効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

成分及び分量 1m<sup>2</sup>中

dl-カンフル…1.80g サリチル酸メチル…9.00g ハッカ油…1.20g l-メントール…4.50g トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g ノニル酸ワニリルアミド…0.01g  
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

## 用法及び用量

- 1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。  
**【用法及び用量に関連する注意】**  
 (1)用法及び用量を厳守してください。  
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
 (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。  
 (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。  
 (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。  
 (6)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元 株式会社 廣 貴 堂 製造販売元 大協薬品工業株式会社  
 富山市梅沢町2丁目9-1 富山市水橋通等173

## お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話：076-479-1313  
 受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)  
 副作用救済制度 電話：0120-149-931

74mm×52mm

22枚入

¥450+税

