



こりと痛みに
気孔付 はりぐすり

第3類医薬品

頭痛、肩こり、
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨節痛

効能又は効果
頭痛、肩こり、
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨節痛

成分及び分量 10cm²中 サリチル酸メチル...9.00g ノニル酸ノニルミド...0.01g
ジエチルグリセリン...1.80g トーメントール...0.50g トロイクロール酢酸
エステル(ビタミンE)...0.50g 添剤として、ポリブチレン、生ゴム、トコフェロール酢酸
エステル、カルメルラン、チルベンチン、ジブチルカルボキシ、ポリブチレン、ポリブチレン、
ポリブチレン、ポリブチレン、ポリブチレン、ポリブチレン、ポリブチレン、ポリブチレン、
天然ゴムラテックス、香料、着色剤等を含む。

大判

気孔付 ビタミンE配合
コ-エパスイットE



大協薬品工業株式会社



気孔付 はりぐすり
配置期限 ロット番号

T01

鎮痛消炎薬 コ-エパスイットE 第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1.次の人は使用しないでください。
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼る。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱く弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判20枚入 400円税別

紙：箱

箔：外装フィルム

製造販売元



大協薬品工業株式会社
富山市水橋部 寺173

お客様相談窓口

電話：076-479-1313(土、日、祝日を除く)
受付時間：9：00～17：00

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931 又は03-3606-9411