

肩こり、腰痛、 関節痛に ケロンパスE

ビタミンE
配合



肩こり・腰痛・
関節痛に

DYK

〈気孔付〉

大判 20枚

第3類医薬品

こりと
痛みに

はりぐすり

配置期限(西暦 年.月) ロット番号

ケロンパスE

第3類医薬品



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)用法及び用量を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(6)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。

(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判20枚入 ¥400+税



箱

外装フィルム

効能又は効果

腰痛,打撲,捻挫,肩こり,
関節痛,筋肉痛,筋肉疲労,
しもやけ,骨折痛

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

成分及び分量

1m²中 d-カンフル…1.80g サリチル酸メチル…9.00g ハッカ
油…1.20g l-メントール…4.50g トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g
ノニル酸ワニリルアミド…0.01g 添加物として,ポリブテン,生ゴム,ポリイソブチレン,エ
ステルガム,テルペン樹脂,沈降炭酸カルシウム,酸化チタン,アクリル酸メチル・アクリル
酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂,ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル,天然ゴム
ラテックス,香料,赤色405号,黄色205号を含有します。

発売元 第一薬品工業株式会社

富山市草島15-1

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173

お客様相談窓口

電話 076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土,日,祝日を除く)