

貼付剤 16枚入

肩こり

腰痛

関節痛

こりと痛みに

ダイラップ®E

肩腰

Shoulder

Waist

ビタミンE配合

● 患部の血行を改善して痛みを鎮める



株式会社 富士薬品

第3類医薬品



箱



外装
フィルム

成分・分量 1.0ml中

d-カンフル…1.80g l-メントール…4.50g サリチル酸メチル…9.00g ハッカ油…1.20g

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g ノニル酸ワニリルアミド…0.01g

添加剤：ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号 含有

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、痛み
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お客様相談窓口 大協薬品工業株式会社
TEL 076-479-1313 (土、日、祝日を除く)



(01)14987524122414(93)1710

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4) 皮膚のとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

16枚入り(1枚の寸法7.4cm×5.2cm)

製造販売元  大協薬品工業株式会社
富山市水橋町等173

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931