

ビタミンE配合

ニューパス(A) 第3類医薬品

140枚入
(4.2cm×6.2cm)

保存袋付



痛みの
もとに密着浸透!

肩こり
筋肉痛
腰痛


消炎鎮痛 plaster 第3類医薬品

消炎鎮痛 plaster 第3類医薬品

痛みの
もとに密着浸透!



肩こり



筋肉痛



腰痛

ビタミンE配合
ニューパス(A)



痛みの
もとに
密着浸透!

ムレにくい
穴あきタイプ

140枚入
(4.2cm×6.2cm)
保存袋付

ビタミンE配合
ニューパス(A)

ビタミンE配合
ニューパス(A)

第3類医薬品



この箱は、環境に配慮し、水なし印刷方式、大豆油インキを使用しております。

製造番号 0E30
使用期限 2014.06



肩こり
筋肉痛
腰痛

痛みの
もとに密着浸透!



4 987754 103637

肩こり 筋肉痛 腰痛



**痛みの
もとに密着浸透!**

**ムレにくい
穴あきタイプ**

140枚入
(4.2cm×6.2cm)

保存袋付

**ビタミンE配合
ニューパス(A)**

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1〜2回ライナーをはがし、患部に貼る。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮ふのとくに弱い方は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5) 皮ふの弱い方は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

1枚 (6.2cm×4.2cm)

発 売 元 **マイクロウェバー株式会社**
広島県三原市沼田西町小原200番地の76

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**
富山県水橋町等173

副作用被害救済制度のお問合わせ先
電話: 0120-149-931又は03-3506-9411

成分及び分量 1.0m²中

サリチル酸メチル9.00g
dl-カンフル1.80g
l-メントール4.50g
ノニル酸ワニルアミド0.01g
ハッカ油1.20g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.50g
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問合せ先 **大協薬品工業株式会社**
お客様相談窓口
電話: 076-479-1313 (土、日、祝日も除く)
受付時間 9:00〜17:00