

肩こり
筋肉痛
腰痛

痛みの
もとに密着浸透!

消炎鎮痛プラスター 第3類医薬品

消炎鎮痛プラスター

第3類医薬品

ビタミンE配合
ニューパス(A)

ビタミンE配合
ニューパス(A)

140枚入
(4.2cm×6.2cm)
保存袋付

痛みの
もとに密着浸透!

肩こり

腰痛

筋肉痛

ムレにくい
穴あきタイプ

肩こり
筋肉痛
腰痛

痛みの
もとに密着浸透!

ムレにくい
穴あきタイプ

肩こり
筋肉痛
腰痛

消炎鎮痛プラスター

痛みのもとに密着浸透!



この箱は、環境に配慮し、水なし印刷方式、大豆油インキを使用しております。

製造番号 1E07
使用期限 2014.09



4 987450 001503

消炎鎮痛プラスター 第3類医薬品

ビタミンE配合 ニューパス(A)

腰痛 筋肉痛 肩こり

痛みの
もとに密着浸透!

ムレにくい
穴あきタイプ

販売名：ニューパス(A)

鎮痛消炎薬

第3類医薬品



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は使用しないでください
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋骨疲労、しもやけ、骨節痛

用法及び用量

1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼る。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚のとくに弱い方は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5) 皮膚の弱い方は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起らないことを確かめしてから使用してください。
- (6) 貼った患部がゴツゴツや電気毛布等で温めないでください。

1枚(6.2cm×4.2cm)

発 売 元 東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川河丸橋1229番地

製造販売元 大協製薬工業株式会社

富山県氷見市 173

副作用被害救済制度のお問合わせ先

電話：0120-149-931又は03-3506-9411



使用上の注意

成分及び分量 1.0m²中

サリチル酸メチル9.00g
dL-カンフル1.80g
L-メントール4.50g
ノニル酸ワニリルアミド0.01g
ハッカ油1.20g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.50g
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸・エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問合せ先 大協製薬工業株式会社

お客様相談窓口

電話：076-479-1313(土、日、祝日を除く)

受付時間 9:00～17:00