

肩こり・腰痛・関節痛に

おきゅ膏Z

温感プラスター(こり・鎮痛温感貼付薬)

〔特 徴〕

おきゅ膏Zはこれを貼りますと、配合成分が患部皮下組織に浸透し、一瞬しみとおるような感じがあります。そして、患部の毛細血管を拡張して血液の循環を高め、筋肉その他の組織に快い温感を与えて、こりや痛みを鎮めます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

3. 本剤の使用による強い刺激を避けるための事項

本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそのような作業やスポーツを行う前には貼らないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

〔効能・効果〕

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、しもやけ、骨折痛

〔用法・用量〕

1日1～2回、ライナーをはがし、患部にはってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (5) 患部が汗等でぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合には、使用を中止してください。

〔成分〕膏体100g (0.70237m²) 中

dl-カンフル	1.26g
l-メントール	3.16g
ハッカ油	0.79g
サリチル酸メチル	6.32g
グリチルレチン酸	0.148g
トコフェロール酢酸エステル	0.35g
ノニル酸ワニルアミド	0.053g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸カルシウム、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、酸化チタン、黒酸化鉄、三二酸化鉄及び黄色三二酸化鉄を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開口部を折り曲げ、外箱に戻して保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先


本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

症状別の貼付参考図



— 筋肉痛、打撲、捻挫 —

押えて痛みのあるところ
圧痛のあるところ
こたえるところ
を選びます。

発売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173



J07
おきゅ膏Z