

この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際には必ずお読みください

第3類医薬品

おきゅ膏[®] Z (鎮痛消炎薬)

おきゅ膏 Z は、これを貼りますと配合成分が患部皮下組織に浸透し、一瞬しみとおるような感じがあって、患部の毛細血管を拡張して血液の循環を高め、筋肉その他の組織に快い温感を与えて、こりや痛みが軽快になります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
3. 本剤使用による強い刺激を避けるための事項
本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には貼らないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量


1日1～2回、ライナーをはがし、患部にはる。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (5) 患部が汗等でぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合には、使用を中止してください。

注 意

紙と一緒にメクレないよう親指のハラで軽くなでるようにしてメクって下さい。



(裏面もお読みください。)

成分及び分量 1.0m²(膏体142.375g)中

dl-カンフル……………1.8g	l-メントール……………4.5g
ハッカ油……………1.125g	サリチル酸メチル……………9.0g
グリチルレチン酸……………0.21g	トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
ノニル酸ワニルアミド……………0.075g	


添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸カルシウム、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、酸化チタン、黒酸化鉄、三酸化鉄、黄色三酸化鉄を含有する。

＜保管及び取り扱い上の注意＞

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 配置期限を過ぎたものは使用しないでください。

ご使用にあたって

1. 下図を参考にし、貼る場所をきめて、患部を乾いたタオル等でよくふいてから貼ってください。
2. 動きの激しい部位に貼用の場合は、よく手のひらで全体を圧着して下さい。
3. 手足に貼用の場合は温感が少ないことがありますので適宜枚数を増やしてください。



■お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話：076-479-1313（土、日、祝日を除く）
受付時間 9：00～17：00

■副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931又は03-3506-9411

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173