

消炎鎮痛薬 **ロ-ドパスC**

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

成分及び分量 1.0㎡中

di-カンフル	1.80g	l-メントール	4.50g
サリチル酸メチル	9.00g	トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g
ハッカ油	1.20g		

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレン・ニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 ☎ 076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 (※) 医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元 日本薬劑株式会社

大協薬品工業株式会社

富山市東中野町一丁目1番1号

富山市水橋町173

1枚(6.2cm×4.2cm)

ビタミンE配合

肩こり
筋肉痛
腰痛

ビタミンE配合

サイズ
6.2cm×4.2cm

ロ-ドパスC

肌に優しくムレにくい

第3類医薬品
140枚
(保存袋付)

肌に優しくムレにくい

第3類医薬品

肩こり・筋肉痛・腰痛

ロ-ドパスC

サイズ

6.2cm×4.2cm

実寸サイズ

140枚

肌に優しくムレにくい

140枚
(保存袋付)肩こり
筋肉痛
腰痛

ビタミンE配合

ロ-ドパスC

におい
さわやか
タイプ発散
浸透

第3類医薬品

サイズ

6.2cm×4.2cm

肩こり・筋肉痛・腰痛

ロ-ドパスC

第3類医薬品

製造番号

使用期限



4 954097 778037

肩こり
筋肉痛
腰痛

ビタミンE配合

サイズ
6.2cm×4.2cm

ロ-ドパスC

肌に優しくムレにくい

第3類医薬品
140枚
(保存袋付)におい
さわやか
タイプ

T11