

ご使用の前に、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬 ジェルテープシクロ

販売名：ジェルテープシクロ

第2類医薬品

△使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人、(2)ぜんそくを起こしたことがある人、(3)妊婦又は妊娠していると思われる人、(4)15歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないこと(1)目の周囲、粘膜等、(2)湿疹、かぶれ、傷口、(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないこと 4. 連続して2週間以上使用しないこと



■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人、(2)他の医薬品を使用している人、(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人、(4)パップ剤でかぶれ等を起こしたことがある人、(5)次の診断を受けた人、消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ、(6)次の医薬品の投与を受けている人、ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(7)高齢者。 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
接触皮膚炎・ 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることもある。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがある。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法及び用量】

ライナーをはがし、1日1回患部に貼ってください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

【用法及び用量に関連する注意】

①15歳未満の小児に使用させないでください。②用法及び用量を厳守してください。③本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。④皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。⑤1回あたり、24時間を超えて貼り続けないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。⑥同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。⑦汗をかいいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。⑧多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がややわらかくなる可能性がありますので、使用をお控えください。⑨粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。⑩貼付後、はがす際にまれに粘着テープと膏体が分離する場合があります。

【成分及び分量】 膏体100g(1000cm²)中

ジクロフェナクナトリウム…1.000g 添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、トメントール、ポリソルベート80、亜硫酸水素ナトリウム、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、エタノール、酸化チタン、モノオレイン酸ソルビタンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

①直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。④開封後はチャックを閉めて保管してください。⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



お問い合わせ先 株式会社富山常備薬

☎0120-137-093 受付時間:9時～18時(年中無休)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

☎0120-149-931



4 580544 060204

〈製造販売元〉大協薬品工業株式会社

富山県富山市水橋畠等173

〈発売元〉株式会社富山常備薬

富山県富山市丸の内1-8-17