

販売名：センブリダイコー

内容量：50g

袋表ラベル


医薬品 日本薬局方

セ ン ブ リ

【用法及び用量】
大人（15歳以上）は1日量1.5gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ、かすを取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】
胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、
食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 50g
LOT. No


4 987716 137250

製 造 元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬有限会社

袋裏ラベル

 **使用上の注意** F

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
医師の治療を受けている人

2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
1ヵ月位服用しても症状がよくなりません

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になります。）

(4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。