

販売名：センナダイコー

内容量：200g

袋表ラベル


医薬品 日本薬局方

セ ン ナ

【用法及び用量】
大人（15歳以上）は1日量1.5～3gに熱湯約150mlを加え、15分間煮た後にかすをこして取り去り、なるべく就寝前1回に服用する。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

【効能又は効果】
便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 200g
LOT. No.  4 987716 137427

製 造 元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬有限公司

袋裏ラベル

 **使用上の注意**

してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。→他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

相談すること 

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人→はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

- 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。→下痢

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。