

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢 方 薬

桂 枝 茯 苓 丸 ダイコー

桂枝茯苓丸は、漢方の古典「金匱要略」に収載され、一般に繁用される処方の一つです。
比較的体力のしっかりした人で、下腹部に抵抗・圧痛がある、のぼせて足が冷えるなどの訴え
がある人の、肩こり、めまい、月経不順、更年期障害などに用いられます。また、打ち身、し
もやけ、しみにも応用されます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は
直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢

【効能又は効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷え
などを訴える次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、
打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ

(裏面をお読みください)

【用法及び用量】

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15歳以上)	15丸	3 回
15 歳 未 満	服用しないこと	

食間又は空腹時に水又は温湯にて服用する。
添付のさじで1回量をはかっておのみください。

—食間とは—

食後2～3時間を指します。

【成分及び分量】

45丸(9,000mg、1日量) 中

成 分	含 量
ケ イ ヒ 末	1,125mg
ブ ク リ ョ ウ 末	1,125mg
ボ タ ン ビ 末	1,125mg
ト ウ ニ ン 末	1,125mg
シャクヤク末	1,125mg

添加物としてハチミツ、白色セラックを含有します。

＜成分及び分量に関連する注意＞

本品は天産物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果にはかわりありませんので安心して服用してください。

— 保管及び取扱い上の注意 —

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本品はハチミツを入れて製丸しておりますので、容器中で丸剤同士が離れにくいがありますが、成分には問題ありませんので、軽く振ってご使用ください。

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬有限会社 試験室

電話：フリーダイヤル 0120-335064

受付時間：9時～12時、13時～17時（土・日・祝日を除く）



大 晃 生 薬 有 限 会 社

〒464-0084 名古屋市千種区松軒一丁目5番12号