

販売名：カンゾウダイコー

内容量：500g

袋表ラベル



医薬品 日本薬局方 規格 刻

カ ソ ゾ ウ

【用法及び用量】
大人（15歳以上）は1日量5gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】
激しい咳、咽喉痛の緩解
（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内 容 量 500g
LOT. No



製 造 元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大 晃 生 薬 有 限 会 社

袋裏ラベル

 使用上の注意 C

してはいけないこと 
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること 
1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
（1）医師の治療を受けている人
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）高齢者
（4）次の症状のある人……むくみ
（5）次の診断を受けた人…高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
（1）まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する。顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

（2）5～6回服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になります。）
（4）開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。