

日本薬局方 カンゾウ

販売名：カンゾウ ダイコー

内容量：500g

袋表ラベル

袋: PE, PP

第2類医薬品 日本薬局方 刻

カンゾウ

【用法及び用量】
大人（15歳以上）は1日量5gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】
激しい咳、咽喉痛の緩解
（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 500g
Lot.


4 987716 121556

製造販売元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬有限会社

袋裏ラベル

⚠ 使用上の注意 C

してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること 

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 次の症状のある人……むくみ
 - 次の診断を受けた人…高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になります。）
- 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。