

米粉末



内袋:PE

大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】大人（15歳以上）は1回量0.5g、
1日2回、食前または食間に服用する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】激しい咳、咽喉痛の緩解

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

日本薬局方

医薬品

カンゾウ末

GLYCYRRHIZAE RADIX PULVERATA

内容量 500g

LOT. No



4 987716 121754

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。



使用上の注意

C

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人……むくみ
- (5) 次の診断を受けた人…高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。