

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

鼻炎・鼻水・気管支炎

呂 仁[®] 〈分包〉

ロ ジ ン

呂仁「分包」は「傷寒論」「金匱要略」という中国の書物に記載されている「小青竜湯」をエキス化し、服用しやすい顆粒剤にしたものです。

ふだんは元気でも、かぜをひいたり、人ごみなどの汚れた空気の場所へ行くと鼻水やくしゃみが出て、ひゅうひゅう、ぜいぜい、といううすい水様のたんを伴ったせきが出ることもあり、非常にくるしいものです。このような症状の方におすすめいたします。

気管支炎、気管支ぜんそく、鼻水などに効果があります。



◆ 使用上の注意 ◆



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
*間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 1カ月位(鼻水・うすい水様の痰を伴う咳に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

◆効能・効果◆

気管支炎、気管支ぜんそく、鼻水、うすい水様の痰を伴う咳、鼻炎

◆用法・用量◆

食前または食間に服用します。

(食間とは食後 2~3 時間を指します。)

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15 歳以上)	1 包	3 回
15歳未満 7 歳以上	2/3 包	
7 歳未満 4 歳以上	1/2 包	
4 歳未満 2 歳以上	1/3 包	
2 歳未満	1/4 包	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止む得ない場合にのみ服用させてください。

◆成分・分量◆

1 日分 3 包 (1 包 1.8g) 中、下記の成分を含有しています。

小青竜湯エキス粉末……………3,900mg

日局マオウ……………1.8g
日局シャクヤク……………1.8g
日局カンゾウ……………1.8g
日局ケイヒ……………1.8g
日局サイシン……………1.8g
日局ゴミシ……………1.8g
日局ハンゲ……………3.6g
日局カンキョウ……………1.8g

より抽出した水性エキス。

添加物として日局乳糖、日局ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

◆保管及び取扱上の注意◆

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤飲の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いいたします。

太虎精堂製薬株式会社 TEL 078-232-1015
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
 **太虎精堂** 製薬株式会社
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通2丁目1の27