

頭痛・歯痛・神経痛

非ピリン剤

医薬品

トッコ-散



TRADE MARK



株式会社 西川栄寿堂

配置期限

● 痛みと熱に ●

トッコ-散

効能又は効果

頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・関節痛・  
神経痛・腰痛・肩こり痛の鎮痛  
悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

大人 15才以上 1回 1包宛  
1日1回1包を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。

成分及び分量 1日量(1包0.9g)中

J P アスピリン	0.4g
J P プロムフレリル尿素	0.2g
J P カフェイン	0.1g
賦形剤 J P パレイシヨデンブ	0.2g

注意

- 次の人は服用しないこと。
  - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - 15歳未満の小児。
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
- 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

発売元 株式会社 西川栄寿堂  
奈良県高市郡高取町大字清水谷1025

2包入(1包0.9g×2) ¥200



分:PE

製造元 大師製薬株式会社  
奈良県橿原市西分町79-2