

平成十七年九月改訂

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

和漢薬強心剤

虔修六神丸

◇心臓は血液を全身に循環させる源でいわゆる生命の原動力です。心臓の働きが弱ると、身体組織や器官は酸素欠乏の状態となり、いろいろな病気をひき起こすようになります。

どうきや息ぎれは、この生命の原動力ともいえる心臓の異常を知らせるサインです。虔修六神丸は、九種の動植物生薬がそれぞれの特長を発揮して、このような「どうき」や「息ぎれ」にすぐれた効きめをあらわします。また、身体がだるくて気力が出ないようなときや、暑さなどで頭がボーッとして意識が低下したり、めまいや立ちくらみがしたときの「気付け」にも効果を発揮します。

使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を使用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
他の強心薬

■相談すること

- 一、次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
- (一) 医師の治療を受けている人。
 - (二) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 二、次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
- (一) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 消化器 |
|------|-------|
| 症状 | 悪心・嘔吐 |
- (二) 五〜六日間服用しても症状がよくなる場合

【効能又は効果】

どうき・息ぎれ・気付け

【用法及び用量】

次の量を、食間に水又は白湯にて服用する。

年齢	一回量	一日服用回数
大人 十五才以上	一粒	二回
十五才未満	服用しないこと	

【用法及び用量に関する注意】

- (一) かまずに服用すること。
- (二) 定められた用法及び用量を厳守すること。

【成分及び分量】

一日量(二粒)中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	はたらき
ジャコウ	一 mg	呼吸機能を高め、全身の酸素不足を改善します。
ゴオウ	二 mg	末梢循環を改善し、心臓の働きを助けます。
センソ	二・五 mg	心筋の収縮力を高め、血液循環をよくします。 また、余分な水分を排泄し、心臓の働きを助けます。
サフラン	二 mg	血行をよくする作用があります。
胆汁エキス末	一 mg (原生薬換算として胆汁15mgに相当する)	消化器の働きをよくし、他の成分の吸収を助けます。
羚羊角末	二・三 mg	鎮静作用によりストレスなどからくる神経の緊張を和らげます。
沈香末	一・五 mg	胃腸の働きを整えて、他の成分の吸収を助けます。
モッコウ末	一・五 mg	気力や意識の減退を回復させます。
d-ボルネオール	一 mg	

添加物として、寒梅粉、サリチル酸、薬用炭及びバレイシヨデンプンを含む。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (二) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (三) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (四) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

大師製薬株式会社 お客様相談室 電話(〇七四四)二三一六〇〇〇

受付時間 午前九時〜午後五時(土、日、祝日を除く)

製造販売元

大師製薬株式会社

奈良県橿原市四分町七九―二

家庭急救薬

セブシヤコウ

虔修六神丸

配合

製造販売元
大師製薬株式会社
奈良県橿原市四分町79-2

効能又は効果 どうき、息ぎれ、気付け

用法及び用量 大人 一回1粒 1日2回
食間に水又は白湯にて服用する。

(用法及び用量に関連する注意)
①かまずに服用すること。
②定められた用法及び用量を厳守すること。

成分及び分量 一日量(2粒)中

ジャコウ	1mg	羚羊角末	2.3mg
ゴオウ	2mg	沈香末	1.5mg
センソ	2.5mg	モッコウ末	1.5mg
サフラン	2mg	d-ボルネオール	1mg
胆汁エキス末(原生薬換算として胆汁15mgに相当する)	1mg		

添加物として、寒梅粉、サリチル酸、薬用炭、バレイシヨデンプンを含む。

使用上の注意

してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	消化器
症状	悪心・嘔吐

- (2) 5〜6日間服用しても症状がよくなる場合

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

15粒入 ¥800

紙袋包装

キャップ