

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚：発疹／消化器：胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

【用法・用量】成人(15才以上)1日1回1本(100mL)

を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

(2) 本剤は生薬成分を含むため、まれに洗でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

大正製薬(株)お客様119番室

電話 03-3985-1800

製造番号

使用期限

(西暦年)

ガラス：瓶

金 属：キャップ

★キャップと瓶は分別して捨ててください

指定医薬部外品

滋養強壮・栄養補給

リポビタミンD
スーパー

タウリン 2000mg

配合

100mL

ニンジン



大正製薬

株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

【成分】100mL中 チアミン硝化物(ビタミンB1) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 10mg、ニコチン酸アミド 20mg、タウリン 2000mg、L-アルギニン塩酸塩 300mg、無水カフェイン 50mg、イノシトール 100mg、ニンジンエキス-P 130mg(ニンジン910mgに相当)

添加物：白糖、D-ソルビトール、ポビドン、グリセリン、脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、安息香酸Na、pH調節剤、クエン酸、香料、バニリン、トリカブリン

【注意】本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません。

【効能】☆肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給☆滋養強壮☆虚弱体質

【保管及び取扱上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



YPIA