

医薬部外品 使用に当たっては、説明書きをよく読んでください。

販売名：ヴィックス メディケイテッド ドロップ O

■使用上の注意 ① 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚：発疹・発赤、かゆみ
 - (2) 1週間使用しても症状がよくならない場合。

■効 能
のどの炎症による声がれのどののの不快感、のどの痛み、のどのはれ、口腔内の炎症、消毒、口臭の除去

■用法・用量
年令に応じて次の量を1回ずつ口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 令	成人(15才以上)	5～14才	5才未満
1回量	3個	2個	使用しないこと
使用回数	1日4～6回		X

※使用するときは、1個ずつためてください。1度に3個(15才以上)、もしくは2個(5～14才)を使用しないでください。

(注 意)
(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) かみくだいたり、のみこんだりしないでください。
■成 分 (18管中)

塩化セチルピリジニウム 8.28mg 添加物：ウエン酸、ピタミンC、L-メントール、香料、黄色5号、pH調整剤、シリコン樹脂乳化液、ブドウ糖液、白糖
■保存法及び取扱上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(服用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 吸湿しやすいので、開封後は袋の口を折り返して保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大正製薬株式会社
東京都豊島区高島3丁目24番1号
http://www.taiyoh.co.jp

お客様119番
電話 03-3985-1800
受付 8:30～21:00
時間 (土、日、夜を要)

Manufactured by:
The Boots Manufacturing Co.(Thailand) Ltd.
Samut Prakan, Thailand.



医薬部外品

VICKS Medicated Drops
ヴィックス メディケイテッド ドロップ

VICKS

のどのあれ、痛み、声がれに...

オレンジ



ヴィックス メディケイテッド ドロップ

製造番号
使用期限

ヴィックス
メディケイテッド ドロップ

開封口



VICKS Medicated Drops
ヴィックス メディケイテッド ドロップ

オレンジ

医薬部外品

20個入(5個×4スティック)

のどのあれ、痛み、声がれに...

VICKS Medicated Drops
ヴィックス メディケイテッド ドロップ

VICKS

オレンジ



11

TJ004-1