

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

滋養強壮・栄養補給

リポビタンD

販売名：リポビタンD

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
 - (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【効 能】

☆肉身体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給
☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

【成 分】 100mL 中

タウリン	1000mg
イノシトール	50mg
ニコチン酸アミド	20mg
チアミン硝化物（ビタミン B ₁ ）	5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B ₂ ）	5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	5mg
無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸 Na、香料、グリセリン、バニリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話 03-3985-1800

大正製薬  株式会社⁶¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号

——本文は、直接ラベルに記載されている事項です——