

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

タウリン・ビタミン B₁・B₂・B₆ 配合

リポビタンDライト

販売名：リポビタンDライト

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
 - (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【効 能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の
栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

成人（15 才以上）1 日 1 回 1 本（100mL）を服用してください。

※15 才未満は服用しないでください。

【注意】

定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に
服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

【成 分】 100mL 中

タウリン	1000mg
イノシトール	50mg
ニコチン酸アミド	20mg
チアミン硝化物（ビタミン B ₁ ）	5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B ₂ ）	5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	5mg
無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、安息香酸 Na、クエン酸、香料、グリセリン、バニリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂ による
もので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1 本あたり 58kcal

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話 03-3985-1800

大正製薬  株式会社⁷²
東京都豊島区高田 3 丁目 24 番 1 号

——本文は、直接ラベルに記載されている事項です——