

かゆい
水虫・たむしに

**タマリン
パウダー**

パウダー
スプレー

第2類医薬品

90g

1日1回

殺真菌成分
テルビナフィン塩酸塩

かゆみ止め成分



使用前に次の説明を必ずお読みください。

タマリン グランデパウダースプレー 第2類医薬品
【使用上の注意】

してはいけません

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤による過敏症(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。(2) 湿疹。(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 幼児児。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 「湿疹」が「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」がかはっきりしない人。(陰のうにかゆみ、ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 患部が顔面又は広範囲の人。(7) 患部が化膿している人。
 - (8) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器をもって医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、腫痛・痒痛(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂

- (2) 2週間単位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合。
(効 能) 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること。
① 炎や火気の近くで使用しないこと。② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④ 火の中に入れないこと。⑤ 使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG・イソペンタン

大正製薬株式会社¹⁾

東京都豊島区高田3丁目24番1号
http://www.taisho.co.jp

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お客様119番室

電 話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

火気厳禁
原液15mL(エタノール含有)

【用法・用量】1日1回、適量を患部に噴射塗布してください

【注 意】(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3) **目に入らないように注意してください。**万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5) 外用にのみ使用してください。(6) 本剤のついでに、目や粘膜にふれないでください。(7) 使用前によく振ってください。(8) 患部まで約10cmの距離で噴射してください。なお、噴射口をよく確かめ、顔面、特に目に向けて噴射したり、吸入しないでください。(9) 同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(本剤は冷却力が強いので、過度の使用により凍傷になる恐れがあるため)

【成 分】90g中 テルビナフィン塩酸塩 135mg、リドカイン270mg、グリチルリチン酸 67.5mg、I-メントール 135mg、添加物：ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ミリスチン酸オキタドシル、エタノール、硬脂酸、グアネチウム、酸化チタン、ステアリン酸アルミニウム、グアネチウム、トワモロコシステイン、LPG、イソペンタン
【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため) (5) 火気に近づけないでください。(6) 本剤は床、家具等との塗



：フィルム(PP)
：キップ(PP)

アルミ：缶
使用期限：缶底に記載

よく振ってお使いください。

● 捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。
● 本品は、フロンガスを使用していません。