

使用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

非ピリン系かぜ薬

第②類医薬品

クミアイ感冒K

- クミアイ感冒Kは（ピリン系の薬を含まない）甘くてのみやすくした顆粒状のかぜ薬です。胃の中でとけやすく、かぜ熱、咳や痛みを軽快させます。
- かぜの発熱は体力の消耗をたかめ、食欲不振、疲労、倦怠感を強めます。本剤はかぜの発熱などで特に消耗しやすいビタミンB₂を補い、かぜの諸症状の快復をたすけます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがあります）
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
 - (5)高齢者。
 - (6)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (7)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状がある人。
高熱、排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブスジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状はかぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	1回量	年 齢	1回量
15歳以上	1包	7歳以上11歳未満	1/2包
11歳以上15歳未満	2/3包	3歳以上7歳未満	1/3包

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 本剤は、3歳未満の乳幼児に服用させないでください。
(3) 1包を分割して使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

成分・分量（3包中）

アセトアミノフェン …… 600mg	d,l-メチルエフェドリン塩酸塩 … 50mg
エテンザミド …… 500mg	無水カフェイン …… 100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 … 7.5mg	リボフラビン …… 10mg
ジヒドロコデインリン酸塩 … 24mg	(ビタミンB ₂)

添加物として乳糖、白糖、サッカリンNaを含有します。
配合成分のビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お客様相談室 大生堂薬品工業株式会社 058-271-9481
(9:00～17:00 土・日・祝祭日を除く)

製造販売元 **大生堂薬品工業株式会社**
岐阜市六条大溝3丁目3番17号