

JA アスマリン 葛根湯シロップ

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用は避けてください。

☑ 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難。(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のたるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

用法・用量

次の量を1日3回食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 本	3 回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量

3本(90mL)(大人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タインウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(β-メントール)を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤には生薬エキスが配合されているために、沈殿を生じることがありますが、このような場合にはよく振りまぜて服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

お客様相談室 058-271-9481

(9:00～17:00 土・日・祝祭日を除く)

