

本草葛根湯シロップケース

さむけ



本草葛根湯シロップ

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

■「相服すること」

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難。(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、腰痛等があらわれる。
肝 臓 能 力 害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

その他の注意 短期間の服用にとどめ、通服は避けてください。

【効能・効果】 かげの初発症状（発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり）
【用法・用量】 次の量を1日3回食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

【成分・分量】 3本（90mL）（大人1日服用量）中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス 「カクコン…8g マオウ…4g タイソウ…4g ケイヒ…3g シャクヤク…3g」 「カンゾウ…2g ショウキョウ…1g より得た乾エキス」	8.3g

添加物として、白糖、ローソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料（8-メントール）を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

発売元 本草製薬株式会社 製造元 大生堂薬品工業株式会社
名古屋市中天白区古川町125番地 岐阜市長者町27番地

発熱



のどの痛み



頭痛



使用期限 製造番号

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの店又は下記までご連絡ください。また、必ずお読み上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目6番21号
電話 052-961-0611（代答） 受付時間 月～金曜日 9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く。）

4 987334 201401

箱
ガラス・ビン
金 属・キャップ