

本草葛根湯シロップ

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 腎臓の弱い人。(5) 発汗傾向の強い人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難。(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害。2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

その他の注意

短期間の服用にとどめ、連用は避けてください。

医薬品

かぜの初期の
諸症状に

本草カッコントウシロップ

葛根湯
シロップ

HONZO KAKKONTOU

30mL

効能・効果

かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

用法・用量

次の量を1日3回食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

成分・分量

3本(90mL)(大人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成 分 (3本中8.3g)
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シヤクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟工エキス)〔添加物として白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(E-メントール)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

発 売 元 本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地

製造販売元 大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

使用期限

製造番号