

さむけ



本草葛根湯シロップ

発熱

のどの
痛み

頭痛



第2類医薬品

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意



■相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難。(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2)5〜6回服用しても症状がよくなるしない場合

【その他の注意】 短期間の服用にとどめ、連用は避けてください。

【効能・効果】 かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

【用法・用量】 次の量を1日3回食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

【成分・分量】 3本(90mL)【大人1日服用量】中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス [カッコン…8g マオウ…4g タイソウ…4g ケイヒ…3g シャクヤク…3g] カンソウ…2g ショウキョウ…1g より得た軟エキス	8.3g

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(0-メントール)を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

発売元 本草製薬株式会社
名古屋市中天白区古川町125番地

製造販売元 大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室 〒468-0046 名古屋市中天白区古川町125番地
電話 052-892-1287(代表) 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く。)
【副作用被害救済制度】電話 0120-149-931

