

服用に際して、この説明文を必ず
お読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に
保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故
が起こりやすくなります)

短期間の服用にとどめ、連用は避けてください。



🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してくだ
さい

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠
していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の
衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。
(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに
薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある
人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難。(9) 次の
診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺
機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持
って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や 白目が黄色くなる)等があら われる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足が むくむ、まぶたが重くなる、 手がこわばる、血圧が高くな る、頭痛等があらわれる。

(2) 5〜6回服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、
のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

用法・用量

次の量を1日3回食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 本	3 回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量

3本(90mL)〔大人1日服用量〕中、次の成分を含有し
ます。

成 分	3本中
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タ インウ4g、ケイヒ3g、ジャクヤク3g、カン ゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として白糖、D-ソルビール、ポリオキシエチレン硬化ヒマ
ン油、安息香酸Na、パラベン、香料(ℓ-メントール)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保
管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管し
てください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 本剤
には生薬エキスが配合されているために沈んで生
じることがありますが、このような場合にはよく振りま
ぜて服用してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は
服用しないでください。

製造販売元 **大生堂薬品工業株式会社**
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

お客様相談室 大生堂薬品工業株式会社 058-271-9481
(9:00〜17:00 土・日・祝祭日を除く)



箱

ガラスビン
金属キャップ

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

