

押して開ける



服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

販売名:アズマリン葛根湯シロップ

第2類医薬品

〔効能・効果〕

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〔用法・用量〕

次の量を1日2回食間に、よく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を
厳守してください。

〔成分・分量〕

2本(90mL) (大人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成 分	2本中
葛根湯エキス(カコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャ ヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
安息香酸Na、パラベン、香料(ℓ-メントール)を含有します。

販売元

本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地

製造販売元

大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

セルフメディケーション

税 控除 対象

△ 使用上の注意



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、
かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心
臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるため、直ちに服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることが
あります。その場合は直ちに医師の
診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドス テロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、 つっぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があら われ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄 疸(皮膚や白目が黄色く なる)、褐色尿、全身の だるさ、食欲不振等があら われる。

満量処方

セルフメディケーション
税 控除 対象

葛根湯

シロップ

1日2回

かぜのひきはじめに

頭痛、肩こり、筋肉痛

眠くなる成分は入っていません。

飲みやすいシナモン味

45mL×2本
(1日分)

第2類医薬品



満量処方 第2類医薬品

葛根湯

シロップ

かぜのひきはじめに

頭痛、肩こり、筋肉痛

1日2回

45mL

飲みやすいシナモン味

- 3.1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に
服用する場合には5~6回)服用しても
症状がよくならない場合は服用を中止
し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少な
い涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して
ください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤
用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しない
でください。

【お客様相談室】本草製薬株式会社
(商品に関するご質問・お問い合わせ)
☎052-892-1287(代表)
(9:00~17:00/土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
☎0120-149-931(フリーダイヤル)



ガラス:瓶 金属:キャップ