



外用殺菌消毒剤

日本薬局方

ベンザルコニウム塩化物液 10W/V%「タイセイ」P

Benzalkonium Chloride Solution

(逆性石ケン液)

10%

500mL

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

第3類医薬品

必ずうすめて使用すること

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと。

顔面、陰股部(陰のう等)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 4) 患部が広範囲な人。
- 5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持
って医師または薬剤師に相談すること。

- 1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。
(創傷面の殺菌消毒)

ベンザルコニウム塩化物液10W/V%「タイセイ」P

日本標準商品分類番号 872616

【効能・効果】

手指・創傷面の殺菌・消毒、口くう内の殺菌・消毒

【用法・用量】

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄
する。

- (1) 手指の殺菌消毒(本品の100～200倍液)
ベンザルコニウム塩化物として0.05%～0.1%
- (2) 創傷面の殺菌消毒(本品の400～1000倍液)
ベンザルコニウム塩化物として0.01%～0.025%
- (3) 含嗽(うがい)の場合(本品の1000～2000倍液)
ベンザルコニウム塩化物として0.005%～0.01%

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等
に浸して貼付しないこと。
- (2) そのままの液または濃厚液が皮ふに付着した場
合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗
い流すこと。
- (3) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の
指導監督のもとに使用すること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入
った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受け
ること。
- (5) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石け
ん分を洗い流してから使用すること。
- (6) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

100mL中 日本薬局方ベンザルコニウム塩
化物10g

〈成分・分量に関する注意〉

- (1) 皮革製品に付着した場合は、変質させる
ことがあるので注意すること。
- (2) 染色した布地は、退色することがあるの
で注意すること。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、涼しいところに
密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管するこ
と。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)

本品についてのお問い合わせは、お買い求め
のお店、あるいは下記にお願いいたします。

大成薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：0942-53-4662(代表)
9:00～17:00(土日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987297 304140



本体:PE
キャップ:PP

使用期限

製造番号