

指定医薬部外品

あかぎれ用薬

グリセリンカリ液

「タイセイ」P

(ベルツ水)

100mL



製造販売元

① 大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
0942-53-4662(代表)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと
湿潤やただれのひどい人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人または家族がアレルギー
体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こ
したことがある人
 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること
- 使用期限

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよく
ならない場合

〔効能・効果〕 ひび、あかぎれ

〔用法・用量〕

そのまま適量を患部に塗布する。

〈用法用量に関連する注意〉

皮膚に塗るだけにとどめ、ガーゼ、
脱脂綿等に浸して貼付しないこと

- (1) 小児に使用する場合には、特に
注意し、保護者の指導監督のもとに
使用すること (2) 目に入らないよ
う注意すること。万一、目に入った場
合は、すぐに水またはぬるま湯で洗
い流すこと。なお、症状が重い場合に
は、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

〔保管および取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しいとこ
ろに密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かないところに保管
すること
3. 他の容器に入れかえないこと
(誤用の原因になったり、品質
が変わるおそれがある)

〔成分・分量〕

本品100mL中：水酸化カリウム
0.3g、グリセリン20mL、エタノール
25mLおよび

添加物として
香料を含有



本 体：PE
キャップ：PP



製造番号