

TRADE



MARK

第2類医薬品

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

クレゾール石ケン液

「タイセイ」P

Saponated Cresol Solution

500mL

貯法：遮光した気密容器

製造販売元

大成薬品工業株式会社

福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

クレゾール石ケン液「タイセイ」P

日本標準商品分類番号 872616

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読み下さい



使用上の注意

⊗ **してはいけないこと**

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1. 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること2. 次の部位には使用しないこと

目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 3) 患部が広範囲の人。
- 4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒

便所、便器、ごみ箱、たんづぼ、浄化そう等、疾病予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

用法・用量

次のように水で希釈して洗浄する。

1. 手指の消毒の場合：2 % (本剤の 50 倍液)
2. 創傷面の殺菌の場合：1 % (本剤の 100 倍液)
3. 便所等の消毒の場合：3 % (本剤の 33 倍液)

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
4. 外用にのみ使用すること。
5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

<希釈方法>

- 33 倍液：本剤を30mLとり、水1Lにうすめる。
50 倍液：本剤を20mLとり、水1Lにうすめる。
100 倍液：本剤を10mLとり、水1Lにうすめる。

成分・分量

本品は、クレゾール42～52vol%を含む。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
5. 本剤のクレゾール臭の移行を避けるため、保管には注意すること。
6. 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状(炎症)が起きた場合は医師の診療を受けること。(原液を取り扱う場合は、保護めがね、ゴム手袋等を着用すること。)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお願いいたします。

大成薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0942-53-4662 (代表)
9:00～17:00 (土日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



L160825 8154

使用期限

製造番号