



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



解熱鎮痛薬

ミチのこども解熱鎮痛顆粒



販売名：ミチのこども解熱鎮痛顆粒

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ミチのこども解熱鎮痛顆粒 は、急な発熱や痛みを緩和するアセトアミノフェンを主成分とした
お子さま用の解熱鎮痛薬です。

特 長

- 1才から11才未満のお子さま用として開発した解熱鎮痛薬です。
- お子さま好みの「イチゴ味」の顆粒剤です。
- 発熱時に消耗するビタミンC（アスコルビン酸）を配合しています。
- 胃にやさしい解熱鎮痛薬です。
- 保存・携帯しやすく、常備薬としても便利な個包装です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、解熱鎮痛薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと ❌

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3) フェニルケトン尿症の人。（本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため。）
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。
 3. 服用前後は飲酒しないでください
 4. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍



- *2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用
を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を
受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のか すれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意 識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群） 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛 み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮ふ上 に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだる い、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮ふや白目が黄色くな る）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわ れる

（裏面につづく）

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

- 1) 悪寒・発熱時の解熱
- 2) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

用法・用量

年 齢	1回量
7才以上11才未満	1 包 
3才以上7才未満	2/3 包 
1才以上3才未満	1/2 包 
1才未満	服用しないこと

1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分とそのはたらき

有効成分1日量 3包 (3.6g) 中

成 分	分量	は た ら き
アセトアミノフェン	450mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
アスコルビン酸（ビタミンC）	150mg	発熱時に消耗するビタミンCを補給します。
グリシン	450mg	解熱鎮痛成分による胃への負担をやわらげます。

添加物としてキシリトール、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ポビドン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステビア抽出精製物、軽質無水ケイ酸、三二酸化鉄、香料を含有します。

本剤に卵、牛乳由来の成分は配合されていません

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限（ケース及び袋に記載）をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りは、袋の口を2度折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 【電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00】

発売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

製造販売元

DAITO DAITO 株式会社
富山県富山市八日町326番地